

医療ルネサンス

No.7430

前立腺がん 記者の選択 1/5



がんの種類	男性の罹患数(人)	全体の10年生存率(%)
前立腺	9万1215	98.8
胃	8万9331	66.8
大腸	8万7019	68.7
肺	8万2880	32.4

*罹患数（その年に新たにがんと診断された人の数）は厚生労働省の全国がん登録（2017年）、10年生存率は全国がんセンター協議会の調査（2020年）より

「結果は、やはり前立腺がんでした」今年9月上旬、東京都内のクリニックで、私（58）は泌尿器科医からそう告知を受けた。その2週間ほど前、前立腺に針を刺して組織を取り、「針生検」を受けていた。病理医による検査で、がんと確定したのだ。がん体験者の記事や手記を読むと、告知を受けて「頭が真っ白になつた」「なぜ自分が、と涙があふれた」との記述が少なくない。しかし私は、「自分もがん

になったか」と淡々と受け止めた。いま思えば、もっと深刻に受け止めるべきだったのだが、動搖しなかつたわけは主に二つある。

一つは、がんはありふれた病気だということ。今は日本人の2人に1人ががんを経験する。私はあと2年で還暦だし、年齢的に珍しくはない。健康には気を使ってきた方だが、それでもがんになることはあり得る、と常常々考えていた。

二つ目の理由は、前立腺がんは昔は欧米に多かつたが、近年は日本でも増えている。最新の2017年のデータでは、新たに診断された患者数（罹患数）は9万1215人と、男性のがんで最も多い。

18年の死亡数は1万2250人で、男性のがんでは6番目だ。先月発表された10年生存率は98・8%と、がんの中で最も高い。

私の父は数年前に前立腺がんと診断されたが、ホルモン療法を受け特に進行せず、今年8月に別の病院

がんでした」今年9月上旬、東京都内に受け止めるべきだったのが、動搖しなかつたわけは主に二つある。

一つは、がんは他のがんに比べて進行が遅く、簡単には死なない、と知っていたことだ。

前立腺は、男性だけにあらゆる臓器。膀胱の真下に尿道を取り囲むように位置し、形や大きさは栗の実やクルミに似ている。精液の約3割を占める前立腺液を分泌し、射精や排尿に深く関わっている。

前立腺がんは昔は欧米に多かつたが、近年は日本でも増えている。最新の2017年のデータでは、新たに診断された患者数（罹患数）は9万1215人と、男性のがんで最も多い。

戸惑いや葛藤を経て、治療法を決めるに至った経緯を報告したい。

（編集委員 山口博弥）

（このシリーズは全5回）

＊過去記事はヨミドクター

ドクターで

「自分も」淡々と受け止め

で94歳で亡くなった父親が前立腺がんの場合、息子が発症する確率は2・5倍に上がる」とされる。

私は読売新聞で医療の取材を通算20年以上続けている。ただ、取材経験があるのは、長く取材している

胃がんのほか、食道がん、膀胱がん、悪性リンパ腫など。前立腺がんについては同僚が書いた記事を読む程度だった。

いざ自分がこの病気になり、診療を受けながら情報を集めると、知らないことが多いと痛感した。自分のがんが、悪性度が高くて再発しやすい「超高リスク」であることや、治療法が複数あり、医師によつて勧める治療法が異なることも分かつてきた。

戸惑いや葛藤を経て、治療法を決めるに至った経緯を報告したい。

2.春雨は水で戻し、ハクサイは長さを4等分に切る。

3.鍋に水気を拭いた(1)、ショウガ、水3カップ、酒大さじ3杯を入れ、強火にかけ煮立つたらアツをのぞき、ハクサイを入れ、蓋をして20分煮て、春雨を入れ5分煮る。

4.長ネギ、ニンニク、しょうゆ

小さじ2杯、酢とゴマ油各

1杯、赤唐辛子を混ぜ、器に

取り分けた(3)に適量をかけ

て食べる。

藤井恵



ハクサイと鶏肉春雨の鍋

時間の目安 40分（鶏肉をおく時間を除く）
熱量 560kcal／塩分 1.9g (1人分)

*材料 2人分

ハクサイ4株（600g）／骨付き鶏もも肉1本（300g）／鶏手羽元4本（200g）／緑豆春雨40g／ショウガ（薄切り）1かけ分／長ネギ（みじん切り）5cm分／おろしニンニク1かけ分／粗びき赤唐辛子小さじ1/2杯

*作り方

1.骨付き肉は軟骨で半分に切り、骨に沿って切り込みを入れる。手羽元も同様に切り込

みを入れる。塩小さじ1/2杯をすり込み、冷蔵庫で1時間～1晩おく。

- 2.春雨は水で戻し、ハクサイは長さを4等分に切る。
- 3.鍋に水気を拭いた(1)、ショウガ、水3カップ、酒大さじ3杯を入れ、強火にかけ煮立つたらアツをのぞき、ハクサイを入れ、蓋をして20分煮て、春雨を入れ5分煮る。
- 4.長ネギ、ニンニク、しょうゆ小さじ2杯、酢とゴマ油各1杯、赤唐辛子を混ぜ、器に取り分けた(3)に適量をかけて食べる。

医療ルネサンス

No.7431

前立腺がん 記者の選択

2/5



記者が飲んでいた「ファイナステリド」の錠剤。個人輸入代行のサイトで購入していた。

PSA（前立腺特異抗原）は、前立腺細胞が作るたんぱくで、前立腺がんがあると血液中の濃度がより高くなる。前立腺肥大でも数値が上がることはあるが、前立腺がんの検査として広く使われている。

4までが正常値で、10までがグレーゾーン、10以上が「疑い」となる（単位はナ・ムラ／ミ・ル）。私のPSA値は4・624

私のPSAの値は、高くはない。しかし、この数値には「裏」があった。

実は私は、8年前から男性型脱毛症の治療薬「ファイナステリド」を毎日飲んでいた。国内では医師の処方薬「プロペシア」（商品名）として承認されている。この薬の服用を続けると、PSA値が半分程度に下がってしまうのだ。添付文書にも「前立腺がん診断でPSAを測定する場合は、2倍

私（58）の前立腺がんが見つかったきっかけは、今年7月に会社の健康診断で受けたPSA検査だ。

PSA（前立腺特異抗原）は、前立腺細胞が作るたんぱくで、前立腺がんがあると血液中の濃度がより高くなる。前立腺肥大でも数値が上がることはあるが、前立腺がんの検査として広く使われている。

医師が肛門から指を入れ、直腸の壁越しに前立腺の大きさや硬さなどを調べる「直腸診」を受けた。続いて、超音波を発信する装置を肛門から入れる検査を受けると、医師は言った。

「がんの疑いがあります。特に右側が大きくて硬い」

で

4

ま

で

が

グ

レ

ー

ゾ

ー

ン

10

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

で

が

1

ま

12/23(水)

(第3種郵便物認可)

*グリソースコアの求め方

最も多いがん細胞と、2番目に多いがん細胞のそれぞれのグレード（1～5）の合計を求める。高いほど悪性度が高い。



前立腺がんに関する読売新聞の過去記事。有名人の体験談に書かれていたグリソースコアは人それぞれだった

泌尿器科医に前立腺がんの疑いを指摘された私（58）は、翌日、紹介された東京都内のA病院で「針生検」を受けた。

超音波を発信する装置を肛門から入れ、映像を見ながら直腸の壁越しにバネ仕掛けの針を前立腺に刺し、組織を採取する。前立腺の左右から6本ずつ、計12本の組織を採取した。

病理医が組織の細胞を顕微鏡で見て、がんの有無や悪性度を調べる。細胞の状態から算出する「グリソ

スコア」の数値が、6以下なら悪性度の低い「低リスク」、7なら「中リスク」、8～10なら「高リスク」と判定される。

9月上旬、病理検査の結果を聞きにA病院の泌尿器科医を受診した。それまでに、読売新聞の前立腺がんの過去記事を数本読んでいた。有名人の体験談では、がんが見つかったのは組織

14本中3本とか、12本中7本とか、人それぞれだ。

だが私の場合、なんと12本全部からがんが見つかっ

た。しかもグリソースコアはすべて7以上で、右側には8や9もあった。紛れもなく「高リスク」のがんだ。後に受けた検査で、さらに悪性度の高い「超高リスク」と判明したが、この時点では分かつてない。

医師からは、手術支援ロボット「ダビンチ」で前立腺を摘出する手術を勧められた。この医師は米国のがん専門病院で経験を積み、ロボット手術の実績も豊富らしい。技術には自信が感じられ、信頼できそうだ。

一瞬、このままお願いし

ようかとも思ったが、がん

は命に関わる病気だ。セカ

ンドオピニオン（別の医師

の意見）を聞かないわけに

はない。やや遠慮がち

にそれを医師に伝えると、

「ぜひ、聞いてください」と快く応じてくれた。

医師が勧めたのが、東京

慈恵医大病院（東京都港

区）。彼の出身大学ではな

悪性度「高リスク」と判定

いが、泌尿器科と放射線治療部の連携が良いという。そこで、今度は放射線治療の目で私の治療法を考えてもらうこととした。

この後、CTと「骨シンチグラフィー」の2種類の検査を受けた。結果を聞くまでは心配だったが、リンパ節や骨へのがんの転移は見つからず、ホッとした。そして9月末、これらのデータを記録したCDや細胞のプレパラートを持ち、同大病院に足を運んだ。

放射線治療部教授の青木

学さんは、私の様々なデータを見たうえで、「開口一番、こう言った。

「あなたのがんの場合、

うちの大学では基本的に手

術はしません」

動画はこち



ヨーグルトティラミス

時間の目安 15分
熱量 241kcal
塩分 0.3g
(1人分)



※水切り、冷やす時間を除く

大さじ3杯をとって器に入れ、ゼラチンをふり入れてふやかす。

3. ポウルに(1)、メープルシロップ大さじ5

杯、バニラエッセンスを入れ、よく混ぜる。

4. (2)を電子レンジ(600W)に20秒かけて溶かし、(3)に入れてよく混ぜる。

5. 生クリームは七分立て

*材料 6人分
プレーンヨーグルト800g／生クリーム1/4カップ／メープルシロップ大さじ7杯／バニラエッセンス少々／粉ゼラチン小さじ1杯／フィンガービスケット10本／濃いコーヒー1/2カップ／ココアパウダー適量
*作り方
1. ヨーグルトは半量にな

30代の男性公務員。1週間前に、交際1年の彼女にプロポーズして承諾の返事をもらいました。しかし、私はマリッジ

いたが

自分に都合の悪い話をながらない癖があり、までにも何かでも時に私が話し合ひます。

医療ルネサンス

No.7433

前立腺がん 記者の選択 4/5

「高リスクの前立腺がんには複数の治療法を組み合わせることが必要」と語る穎川さん（東京都港区の東京慈恵医大病院）



「高リスクの前立腺がんでは、見えない転移がある可能性が高いからです」
青木さんは、手術を完全にそう言われた。

胃がんの場合、治療後5年間で再発がなければ「根治した」と考える。だが前立腺がんは10年生きられるから良いがんとは限らない。

「10年生存率98・8%」の裏には、進行しない人や治る人がいる一方で、再発を繰り返して不

うちの大学では基本的に手術はしません」。東京慈恵医大病院にセカンドオピニオン（別の医師の意見）を行った私（58）は、放射線治療部教授の青木学さん（別医師の意見）を聞きに行つた私（58）は、放

射線治療部教授の青木学さん（別医師の意見）を聞きに行つた私（58）は、放

標準治療 定まらない現実

には否定しなかつたが、こ

安の中で10年暮らす人や、骨転移の痛みに苦しみ続ける人、10年を過ぎて亡くなる人が存在するのだ。

青木さんが私に勧めた治

理検査の「グリソシスコア」が悪性度の高い「9」で、かつ精囊にもがんがあると、「超高リスクがん」という分類になる。

こうなると、前立腺と精

囊を摘出しても根治の望みは薄いだろう。A病院には手術予定日を押さえてもらつたが、キヤンセルの連絡を入れた。

私は、医療取材のネットワークを駆使し、大学やがん専門病院の泌尿器科医数人に私のがん情報を伝え、メールで意見を聞いた。

私は、医療取材のネットワークを駆使し、大学やがん専門病院の泌尿器科医数人に私のがん情報を伝え、メールで意見を聞いた。

2.アボカドは種に沿ってぐるりと包丁を入れ、半分に割って種、皮を除く。幅1cmに切る。
3.細ネギは小口切りにする。
4.紫タマネギはみじん切りにする。
5.ワインビネガーに(4)を入れて混ぜ、塩、コショウ各少々、オリーブ油大さじ3杯を混ぜる。
6.器にエビ、サーモン、アボカドを並べ、(5)の三分量を全体にかける。覆うようにカブを並べて、よく冷やす。食べる直前に残りの(5)をかけ、細ネギを散らす。

よみうりグルメ部



*過去記事はヨミ
ドクターで

「受けたい医療 2021年版」が発売中。一般書店と読売新聞販売店で扱っています。

きょうのひと皿



カブと魚介のサラダ

時間の目安 30分 / 热量 416kcal / 塩分 2.0g (1人分)


*材料 2人分

ゆでエビ100g／スマートサーモン4枚／アボカド1個／カブ2個／細ネギ2本／白ワインビネガー大さじ2杯／紫タマネギ1/6個

*作り方

1.カブは皮をむき、スライサーなどで薄い輪切りにする。熱湯に塩少々を加えてカブを入れ、30秒ほどゆでる。ざるに上げて冷ます。

藤井恵



前立腺がんの資料に目を通す山口編集委員。治療の選択に様々な情報を集めることの重要性を実感した

ツト手術が前立腺がんに保険適用されてから、その傾向は加速したという。もちろん、手

私は東京慈恵医大病院で治療を受けることに決めた。手術と放射線治療の実施件数に偏りがなく、泌尿器科と放射線治療部の連携が良く、両教授の説明にも納得がいったからだ。

(編集委員 山口博弥)
(次回は1月4日から「伝える/伝わる」です)

「超高リスク」の前立腺がんに対し、医師によって勧める治療法が違う。こうなつたら、自分で情報収集して決めるしかない。

私は(58)は、苦手な英語に悪戦苦闘しながら海外の論文に目を通して、関連書籍を5冊購入し、ブログで患者の体験記を読んだ。前立腺がんの患者会「腺友俱楽部」にも入会した。

すると、日本の前立腺がん医療の特異性が見えてき

た。欧米では、手術や放射線、抗がん剤など各分野の専門医が協議し、ガイドライン(診療指針)を定める。

しかし日本では、日本泌尿器科学会が診療指針の作成を主導し、他科の医師の参加は多くない。放射線治療

そのせいか、放射線治療が積極的に行われている欧米と異なり、日本ではどうしても手術偏重になる傾向がある。2012年にロボ

武内務さん(72)は「泌尿器科医から手術を前提にした

説明を受け、勧められるまま前立腺を摘出して再発

すじく多い」と指摘する。

前立腺がんと診断された患者に、武内さんはこう助

言する。「進行が遅いので治療を急ぐ必要はない。医師に待つてもらい、落ち着いて情報収集してください」

私は10月中旬からホルモン療法の注射を始め、7・48

だつたPSA値は今月14日に0・68に下がった。

「前立腺がんは新しい薬が次々に登場している。完

全に治らなくても、進行の先延ばしを繰り返し、病気の慢性化を目指せばよい」と泌尿器科主任教授の額川晋さん。私も希望を持って治療を続けていきたい。

40代の専業主婦。心が通じ合わない夫と波風を立てずに暮らし続けるべきか、離婚を視野に入れるべきか迷っています。

外出は夫の実家。話しかけると「話すのが下手」と判され、メールやメモに返事なし。夜の生活はありません。働きたいと

情報集め治療法を決断

術で根治できる場合は多いが、再発する例も少なくない。早期でも手術後に2割が再発していた、という調査もある。

数多くの患者相談に乗っている腺友俱楽部理事長の武内務さん(72)は「泌尿器科医から手術を前提にした説明を受け、勧められるままで超高く高い治療法と比べてもトリモダリティーを行つた

同様、ホルモン療法を継続する。週間行う。続いて2年間、ホルモン療法を継続する。

定期的な注射で男性ホルモ

ンを抑え、がんの勢いを弱める。次に、前立腺に針を刺して強い放射線を当てる

「高線量率組織内照射(HDR)」を2回行い、外から照射する「強度変調放射線治療(IMRT)」を5

過去のレシピ よみうりグルメ部

白インゲン豆と鶏肉のカスレ風

時間の目安 80分/熱量 406kcal/塩分 0.7g (1人分)



*材料 2人分

白インゲン豆(水煮)230g(固形量)
/白インゲン豆のゆで汁1/2カップ/鶏もも肉1/2枚(125g)/タマネギ1/2個
/カットトマト(缶詰)200g/バタ-20g

*作り方

- 鶏肉は一口大に切り、塩、コショウ各少々をすり込む。
- タマネギは薄切りにする。
- フライパンにバターを溶かし、肉を皮目を下にして入れ、こんがり焼けたら返す。
- タマネギを加え、しんなりするまでいため、白インゲン豆、ゆで汁、カットトマトを入れ煮立てる。塩、コ

5.耐熱容器に(4)を入れ、160度に熱したオーブンに入れ、60分焼く。

カスレは白インゲン豆と肉を使うフランスの煮込み料理。豆のゆで汁が足りない場合は水を足してください。

見合いで結婚した

40代の専業主婦。心が通じ合わない夫と波風を立てずに暮らし続けるべきか、離婚を視野に入れるべきか迷っています。

外出は夫の実家。話しかけると「話すのが下手」と判され、メールやメモに返事なし。夜の生活はありません。働きたいと

うと、「家事育児の