

医療ルネサンス

No.6023

前立腺がん最新事情

1/5

東京都の男性会社員(69)は2009年12月、区の健康診断を受けた際、かかりつけの医師の勧めで「PSA検査」を受けた。前立腺の細胞が作り出す「PSA」という物質が血液中にどれだけあるかを調べる血液検査だ。基準値4(単位はナ・ダ・ミ・ル)を上回る。前立腺がんの可能性が高まる。

男性の結果は8・9。同月末、インターネットなどで調べた東京医大病院(東京都新宿区)を受診。前立腺に針を刺して組織を調べる検査などを受け、前立腺がんと確定診断された。

男性は「両親もがんでなかつたので、驚きました。早くがんを全部取つてしまいた」と振り返る。10年2月、前立腺や隣にある精のうを摘出し、膀胱と尿道をつなぐ手術を受けた。

手術用ロボット「ダビンチ」を使って行う前立腺がんの手術(東京医大病院提供)



◆前立腺がんで行われる手術法

開腹手術	下腹部を縦に12~15cmほど切開し、行う
腹腔鏡手術	腹部に1cm程度の小さい穴を開け、腹腔鏡などの手術器具を挿入して行う
ミニマム創手術	腹部を5cm程度切開し、腹腔鏡などを差し込み行う
ロボット手術	腹部に1cm程度の小さい穴を開け、腹腔鏡などを挿入。ロボットを介して手術器具を操作する

(東京医大病院泌尿器科教授の大堀理さんによる)

くらし
家庭

(このシリーズは全5回)

東京都の男性会社員(69)は2009年12月、区の健康診断を受けた際、かかりつけの医師の勧めで「PSA検査」を受けた。前立腺の細胞が作り出す「PSA」という物質が血液中にどれだけあるかを調べる血液検査だ。基準値4(単位はナ・ダ・ミ・ル)を上回る。前立腺がんの可能性が高まる。

男性の結果は8・9。同月末、インターネットなどで調べた東京医大病院(東京都新宿区)を受診。前立腺に針を刺して組織を調べる検査などを受け、前立腺がんと確定診断された。

男性の結果は8・9。同月末、インターネットなどで調べた東京医大病院(東京都新宿区)を受診。前立腺に針を刺して組織を調べる検査などを受け、前立腺がんと確定診断された。

男性の結果は8・9。同月末、インターネットなどで調べた東京医大病院(東京都新宿区)を受診。前立腺に針を刺して組織を調べる検査などを受け、前立腺がんと確定診断された。

ロボット手術少ない出血

男性が受けたのは、「ダビンチ」というロボットを介して手術器具を操作する「ロボット手術」だ。腹部に複数、小さな穴を開け、腹腔鏡や手術用のはさみを差し込む。術者は、手術台から少し離れた所にある箱形の操作装置に体をうすめよう。座り、3次元画像を見ながらコントローラーで手術器具を操る。12年に保険適用された。

男性の回復も早く、退院後4日間、自宅療養しただけで職場復帰した。先月のPSA値は0・1未満。前は帰宅が遅かったのです。

同病院泌尿器科教授の大堀理さんは「この方法も、腹腔鏡手術」、「ミニマム創手術」=表もある。

が、今は規則正しい生活を心がけています」と話す。手術は、がんを全部取り切るため、根治が期待できる。通常、75歳以下で、がんが前立腺内にとどまり、骨などに転移していない場合に行われる。ロボット手術のほか、下腹部を12~15センチほど切開する「開腹手術」や、腹腔鏡などを使う「腹腔鏡手術」、「ミニマム創手術」=表もある。

手術は、がんを全部取り

る。通常、75歳以下で、が

んが前立腺内にとどまり、骨などに転移していない場

合に行われる。ロボット手

術のほか、下腹部を12~15センチほど切開する「開腹手術」や、腹腔鏡などを使う「腹

腔鏡手術」、「ミニマム創手術」=表もある。

手術は、がんを全部取り

る。通常、75歳以下で、が

んが前立腺内にとどまり、骨などに転移していない場

合に行われる。ロボット手

医療ルネサンス

No.6024

前立腺がん最新事情

2/5



画像を見ながら、前立腺がんの患者に小線源治療を行う三木健太さん（東京都港区の慈恵医大病院で）

前立腺がんの治療を受けた親戚の話を参考に昨年3月、慈恵医大病院（東京都港区）を受診。手術では尿失禁が起こる可能性があることから、約2か月後、放射線治療の一つ、「小線源治療」を受けた。

男性は今月末で仕事を辞める。「これからは好きな海釣りを存分に楽しめたいです」と笑顔を見せる。

放射線治療は主に外照射と小線源の2種類ある。外照射はコンピューター制御により前立腺の形に合わせて照射範囲を調整する方法が普及している。部分びと

前立腺がんでは、病気の進行度や悪性度にかかわらず、放射線治療が広く行われている。

千葉県成田市の公務員男性（65）は2012年12月、人間ドックを受診し、血液検査を初めて受けた。する

月後、さらに数値が上がり、前立腺がんと診断された。

前立腺がんの治療を受けた親戚の話を参考に昨年3月、慈恵医大病院（東京都港区）を受診。手術では尿失禁が起こる可能性があることから、約2か月後、放射線治療の一つ、「小線源治療」を受けた。

男性は今月末で仕事を辞める。「これからは好きな海釣りを存分に楽しめたいです」と笑顔を見せる。

放射線治療は主に外照射と小線源の2種類ある。外照射はコンピューター制御により前立腺の形に合わせて照射範囲を調整する方法が普及している。部分びと

子を見ていたが、3～4か月後、さらに数値が上がっていた。13年11月、前立腺に針を刺して組織を調べる検査を受け、前立腺がんと診断された。

超音波による画像で確認しながら、「ヨウ素125」という放射性物質を詰めた大さ約1ミリ、長さ5ミリ程度のチタン製のカプセルを、腫瘍のある前立腺の中に80～100個程度、埋め込んでいく。がんに集中的に放射線を照射でき、高い治療効果が望める。

男性は昨年7月、体の外から放射線を当てる「外照射治療」も併せて受けた。その結果、治療前は7程度まで上がっていたPSA値が下がり、先月には1を切った。

男性は「これからは好きな海釣りを存分に楽しめたいです」と笑顔を見せる。

放射線治療は主に外照射と小線源の2種類ある。外照射はコンピューター制御により前立腺の形に合わせて照射範囲を調整する方法が普及している。部分びと

度変調放射線治療を取り入れる施設もある。外照射治療は通院で行えるが、通常、2か月程度、連続しての入院で治療が済む。ただししばらくの間、微量の放射線が体外に放出される。


同病院泌尿器科講師の三木健太さんは「一緒に暮らす家族でも年間の被曝量は胸のエックス線1/2枚程度で問題ありません。ただ妊娠や乳幼児との長時間の接触は、念のため、1～2か月、避けた方が安全です」と説明する。また、性行為を行うと、精液とともにカプセルが出てくることもある。注意が必要だ。

川晋さんは「小線源は腫瘍が前立腺内にとどまる場合に効果を発揮し、外照射は周辺に広がっている場合にも有効です。がんの状態や生活スタイルによって最良の治療法は変わってきます」と話している。

体に埋め込む小線源治療

名家歌劇団を三指す人が通う塾

くらし
家庭



● タラの香りゴボウ揚げ (118kcal・塩分0.3g／1人)

ゴボウを繊維に沿って千切りし、タラに付けて、パリパリの衣に。

【材料 2人分】タラ100g／ゴボウ50g／溶き卵大さじ1杯弱／粉ざんしょう少々

【作り方】①ゴボウは皮をこそぎて洗い、まな板に置いて、ピーラーを使って長めの薄切りにする。重ねて4cm長さに切る。繊維に沿って

◇ 「のっけてご飯とかんたん麺」（オレンジページ、722円税抜き）一口コンロでも作れる、簡単な丼と麺料理のレシピ

を紹介している。天津丼や照り焼きチキン丼、タイ料理のガバオライスなど、白飯にのせるだけのレシピが約30種類。ほかに、

炊飯器で作るビビンバご飯やチキンライスなども。手順はすべて写真付きで説明してあるので分かりやすい。

「尿のコントロールができない感じました」
千葉県内に住む会社役員の男性(65)は昨年12月、前立腺がんの手術を受けてから、尿が漏れる「尿失禁」に悩まされている。

前立腺がんの手術を受けた多くの場合、尿失禁が起る。尿道を閉めたり緩めたりし、排尿を制御する「尿道括約筋」がまひしたり損傷したりするためだ。男性は「信頼できる先生に、確実にがんを取つてもらつことが第一」と考え、近くの病院で手術を受けた。だが数日後、尿道からカテーテル(細い管)を抜くと、ベッドから体を起こしたり、立つたりするだけで尿が漏れた。起きている間は2時間おきに、尿漏れパッドを替えなければならぬ状態だった。

尿失禁の改善に有効なのが「骨盤底筋体操」だ。尻



手術後1~2か月

尻に軽く力を入れ、緩める運動を繰り返し、筋肉のまひをとる。回数は無理のない程度でよい

手術2か月後以降

尻に強く力を入れ、ゆっくり緩める。筋肉量を増やすことを目的に朝と晩の2回に分け、1日計約40回繰り返す


に力を入れて抜くという運動で、骨盤の底で膀胱などを支える骨盤底筋という筋肉群を鍛える。尿道括約筋もここに含まれる。男性もこの体操に取り組む。「肛門を絞る気持ち」で力を入れ、ゆっくり五つ数えて力を緩める。1セット10回、1日計4セット行う。尿漏れが続いているため、トイレに行つても尿は出なかつたが、今月に入り、出るようになった。「効果が出始めている気がします

骨盤底筋鍛え尿失禁改善

骨盤底筋は、排尿時に尿を止めたり、排便時に便を切るよう肛門に力を入れたりすると意識できる。北里大病院(相模原市)泌尿器科教授の岩村正嗣さんは、「人工尿道括約筋」という器具を尿道に装着する手術を行うこともある。前立腺がんで手術や放射線治療を受けると、「性機能障害」が起ることが少なくない。ただ、勃起神経を残せば性機能も温存できる場合が多い。岩村さんは「神経を残せば、尿失禁の回復にも良い」という研究結果もあります。がんの位置や悪性度などにもよりますが、神経を残せるかどうか、主治医に相談してみましょう」と話している。

* * *

20代の会社員女性。上司から、後輩社員を厳しく指導するように言われ、悩んでいます。私は、普段から後輩の話をよく聞き、褒め



● エビとポテトの揚げシューマイ (287kcal・塩分0.7g/1人)

ギョーザの皮で作ると、揚げても、チヂチした食感に仕上がります。

【材料 2人分】むきエビ100g/ジャガイモ100g/小ネギ1本/ギョーザの皮(大)10枚/ショウガ汁小さじ1/2杯/カレー粉同1/4杯

【作り方】①ジャガイモは洗って耐熱性のポリ袋に入れ、口は閉じずに耐熱皿にのせる。電子レンジ(600W)で2分加熱。袋の外から竹串を刺して

スッと通れば取り出す。硬ければ、さらに30秒ほど加熱。袋から出して水を取り、皮をむいてつぶす②エビは背わたを除き、細かく刻むか、フードプロセッサーにかける。小ネギは小口切りに③ボウルに①、②を入れ、しょうゆ、酒、片栗粉各小さじ1杯、ショウガ汁を加え混ぜ、10等分する④麺棒でギョーザの皮を1.2倍ほどに延ばし、中央に③をのせ、きんちゃく状に包む⑤170度の油で揚げ、カレー粉を混ぜた塩小さじ1/4杯につけて食べる。

医療ルネサンス

No.6026

前立腺がん最新事情

4/5



診察中に患者の話に耳を傾ける鈴木さん（右）（千葉県佐倉市の東邦大医療センター佐倉病院で）

がんが前立腺内にとどまらず、周辺の組織に広がつたり転移があつたりする場合薬を使つた「ホルモン療法」が行われる。千葉県佐倉市の男性（78）は2013年8月、排尿が思うようにいかず、近くの病院を受診した。血液で前立腺がんの可能性を調べる「PSA検査」を受け、前立腺がんを疑われた。その後、東邦大医療センター佐

倉病院（同市）を受診し、確定診断された。男性のがんは、膀胱など周辺の臓器にも広がつてた。手術では治せないと判断され、ホルモン療法を受けることになった。

前立腺がんでは、男性ホルモンが腫瘍の増殖を促す。ホルモン療法は、薬でホルモンの分泌や働きを抑える。

男性は、脳の下垂体に作用し男性ホルモンの分泌を抑える注射薬と別の飲み薬を併用。その結果、一時的にPSA値が下がつたが、半年後に再び上昇した。前立腺がんは、ホルモン療法を受けていたうちに効かなくなることがあり、薬を変更して対応する。

男性は現在、3剤目となる「イクスタンジカプセル」（商品名）を服用している。

昨年5月に発売された新薬で、がん細胞と男性ホルモ

「ホルモン療法」新薬続々

倉病院（同市）を受診し、

確定診断された。

男性のがんは、膀胱など

周辺の臓器にも広がつて

た。手術では治せないと判

断され、ホルモン療法を受

けることになった。

前立腺がんでは、男性ホ

ルモンが腫瘍の増殖を促

す。ホルモン療法は、薬で

ホルモンの分泌や働きを抑

える。

●これまでのホルモン療法が効かなくなつた場合に使う新薬

商品名(種類)	作用の仕方	報告されている主な副作用
イクスタンジカプセル (飲み薬)	がん細胞と男性ホルモンの結合を強力に抑え、がんが増殖しないようにする	食欲減退、倦怠感
ザイティガ錠 (飲み薬)	精巣、副腎、前立腺がんで男性ホルモンの生成に関わる酵素が働かないようにする	肝機能障害、低カリウム血症
ジエブタナ (点滴薬)	がん細胞内のたんぱくにくつき、細胞分裂を防ぎ、がんの増殖を抑える抗がん剤	白血球の一種「好中球」の減少

た場合は、ホルモン療法を用います。効果が続く期間は患者さんによって異なり、10年間ぐらい進行を抑えられることもあります」と説明する。

昨年、従来薬によるホルモン療法が効きにくい前立

腺がんに対応する新薬が相

次ぎ発売された。イクスター

ンジカプセルのほか、9月

には「ザイティガ錠」(同)

が登場。また、通常、ホル

モン療法が効かなくなつた

時に使われる抗がん剤に

も、「ジエブタナ」(同)

という新薬が同月から使え

るようになつてている。

ただ、新薬は食欲減退や

肝機能障害、低カリウム血

症、白血球の一種「好中球」

の減少といった副作用が報

告され、死亡例も出ている。

鈴木さんは「適正に使用す

れば問題なく、過度に怖が

る必要はありません。体の状態により副作用が出やすくなることもあります。主治医に体調についてきちんと説明することが大切です」と話している。

木啓悦さんは「前立腺がんがそれほど進行していない段階でも、高齢で見つかつます」と話す。

今は進行が抑えられており、男性は「症状もなく安心しています。病気がわかる前と同じ生活ができるい

ます」と話す。

●アサリのトマトチャウダー (249kcal・塩分1.9g／1人)

【材料 2人分】アサリ（砂抜き済み）100g／タマネギ（小）½個／ベーコン½枚／カブ（小）1個／ジャガイモ（小）1個／ホールトマト（缶）200g／固形スープのもと1個／牛乳½カップ

【作り方】①アサリは殻と殻をこすり合わせ、洗う②タマネギ、カブ、ジャガイモは1cm角の

薄い正方形に切る。ベーコンは湯通しをしてから、1cm角に切る③鍋にサラダ油小さじ2杯を熱し、タマネギを色がつかない程度に2～3分いため、小麦粉小さじ2杯を加えていためる④水2カップと固形スープのもとを加え、ホールトマトをつぶして入れ、煮立ったらアクを除く。塩、コショウ各少々、ベーコン、カブ、ジャガイモを入れて12～15分、野菜が軟らかくなるまで煮る⑤アサリを加え、アサリの口が開くまで3～4分煮て、牛乳を加えて火を止める。器に盛り、あれば、みじん切りのパセリ少々をふる。

◇「夫をなくしてからのひとりの生き方」（主婦の友社編、1300円税抜き）雑誌「ゆうゆう」編集部に寄せられた、夫に

先立たれ、ひとりの生活を余儀なくされている女性たちの体験談を紹介。喪失感を乗り越え、一步踏み出すためのヒントを示

す。うつ病の可能性をチェックするリストや、同じ境遇の人たちと語り合える全国各地の自助グループの連絡先も掲載。



●アサリのトマトチャウダー (249kcal・塩分1.9g／1人)

【材料 2人分】アサリ（砂抜き済み）100g／タマネギ（小）½個／ベーコン½枚／カブ（小）1個／ジャガイモ（小）1個／ホールトマト（缶）200g／固形スープのもと1個／牛乳½カップ

【作り方】①アサリは殻と殻をこすり合わせ、洗う②タマネギ、カブ、ジャガイモは1cm角の

薄い正方形に切る。ベーコンは湯通しをしてから、1cm角に切る③鍋にサラダ油小さじ2杯を熱し、タマネギを色がつかない程度に2～3分いため、小麦粉小さじ2杯を加えていためる④水2カップと固形スープのもとを加え、ホールトマトをつぶして入れ、煮立いたらアクを除く。塩、コショウ各少々、ベーコン、カブ、ジャガイモを入れて12～15分、野菜が軟らかくなるまで煮る⑤アサリを加え、アサリの口が開くまで3～4分煮て、牛乳を加えて火を止める。器に盛り、あれば、みじん切りのパセリ少々をふる。

